

ВНИМАНИЕ! ВАРРОАТОЗ!

ПАРАЗИТАРНАЯ БОЛЕЗНЬ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ, ВЫЗЫВАЕМАЯ КЛЕЩОМ, КОТОРЫЙ ПОРАЖАЕТ ВЗРОСЛЫХ ОСОБЕЙ И РАСПЛОД

ИСТОЧНИК:

ПОРАЖЕННЫЕ
КЛЕЩОМ ПЧЕЛИНЫЕ
СЕМЬИ, РОИ,
ТРУТНЕВЫЙ РАСПЛОД



ДИАГНОЗ

СТАВЯТ НА ОСНОВАНИИ
ВИЗУАЛЬНОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ КЛЕЩЕЙ
НА ПЧЕЛАХ, В РАСПЛОДЕ
И ВОСКО-ПЕРГОВОЙ
КРОШКЕ СО ДНА УЛЬЕВ

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА:

ПОЯВЛЕНИЕ УРОДЛИВЫХ, НЕСПОСОБНЫХ К ПОЛЕТУ ПЧЕЛ И ТРУТНЕЙ. ПРИ СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ: ГИБЕЛЬ РАСПЛОДА, ВЫБРАСЫВАНИЕ ИЗ ГНЕЗД ПОГИБШИХ ЛИЧИНОК, ГИБЕЛЬ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ЗИМОВКИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ:

- повышают жизнеспособность семей
- проводят деакаризацию ульев, инвентаря, сотов
- проводят обработку пчел специальными препаратами
- снижают численность клещей (систематически удаляют печатный трутневый расплод, применяют сетчатые подрамники, изымают печатный расплод, после выхода всех пчел из ячеек обрабатывают специальными препаратами)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ:

УСТАНАВЛИВАЮТ КАРАНТИН

Запрещена: кочевка, перестановка сотов с расплодом из одной семьи в другую.
Уменьшают межхозяйственные связи, не допускают слет роев