

ВНИМАНИЕ!

ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА!

ХРОНИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В РАЗВИТИИ БОЛЕЗНИ РАЗЛИЧАЮТ ТРИ СТАДИИ: **БЕССИМПТОМНАЯ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ (ОПУХОЛЕВАЯ)**

- **ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ:** инфицированные и больные животные на всех стадиях течения болезни
- **ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ:** кровь, молоко, биологические жидкости, содержащие лимфоидные клетки инфицированного и больного животного
- **ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ:** внутриутробное, при совместном содержании и выпасе здоровых и инфицированных (больных) животных, не соблюдение правил **асептики и антисептики** при проведении зооветеринарных мероприятий

По своему строению и функциональным особенностям вирус лейкоза крупного рогатого скота подобен вирусу Т-клеточного лейкоза человека (HTLV-I и HTLV-II)

ЛЕЧЕНИЕ НЕ РАЗРАБОТАНО, ИНФИЦИРОВАННЫЙ ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА СКОТ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЖИЗНЕННЫМ ВИРУСОНОСИТЕЛЕМ!

По вопросам профилактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота
ОБРАЩАЙТЕСЬ В УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
или по телефонам: 8 (4212) 31-19-80, 31-59-78

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Последовательность диагностических исследований на лейкоз

