

КОНТАГИОЗНАЯ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА



ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

характеризующееся крупозной пневмонией, плевритом
с последующим образованием в легких секвестров (участков омертвевшей ткани)

- **Источник инфекции:** больные или переболевшие животные, у которых возбудитель длительное время выделяется в окружающую среду с истечениями из носа, бронхиальным секретом при кашле, а также с мочой, калом, молоком или околоплодной жидкостью
- **Основные пути передачи:** воздушно-капельный, не исключается передача с кормом, половым путем и от матери к потомству
- **Инкубационный период:** от 1 - 6 месяцев
- **Клинические признаки:** истощение, лихорадка, респираторные симптомы (одышка, кашель, назальные истечения)
- **Восприимчивые животные:** крупный рогатый скот, зебу и буйволы

ЛАБОРАТОРНЫЙ ДИАГНОЗ

(выделение и идентификация возбудителя)

серологические и вирусологические исследования
(ИФА, РСК, РГА, РА),
молекулярно-биологическое исследование (ПЦР)

ПРОФИЛАКТИКА

- в благополучных зонах – карантин ввезенного скота, убой всех животных в стадах, где обнаружены положительно реагирующие животные, контроль перемещения животных;
- в неблагополучных зонах – вакцинация восприимчивых животных

Лечение неэффективно!

ВНИМАНИЕ!!!

только 33 % животных проявляют ярко выраженную инфекцию, 46 % инфицированы бессимптомно и 21 % устойчивы к инфекции

**При обнаружении клинических признаков контагиозной плевропневмонии у крупного рогатого скота
СООБЩАЙТЕ В УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
или по телефонам: 8 (4212) 31-19-80, 31-59-78**

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!